

## ЗАДАЧА З ІНТЕГРО-КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ЛЯМЕ У ПРОСТОРАХ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ

У шарі  $[0, T] \times \mathbb{R}^p$  досліджено задачу з інтегро-крайовими умовами за часовою координатою  $t \in [0, T]$  для узагальненої системи рівнянь Ляме динамічної теорії пружності у класі майже періодичних за просторовими змінними  $x_1, \dots, x_p$  функцій. Знайдено критерій єдиності та необхідні, необхідні і достатні, а також достатні умови існування розв'язку цієї задачі. Для розв'язання проблеми малих знаменників, які виникли при побудові розв'язку задачі, використано метричний підхід.

In the strip  $[0, T] \times \mathbb{R}^p$ , we investigate a problem with integral-boundary conditions in time coordinate  $t \in [0, T]$  for generalized system of Lamé equations of dynamic elasticity theory, in the class of almost periodical functions in spatial variables  $x_1, \dots, x_p$ . We found a uniqueness criterion, and necessary, necessary and sufficient, and sufficient existence conditions for the solution of this problem. To solve the problem of small denominators arising while constructing a solution of the problem, we use the metrical approach.

**Вступ.** Багато фізичних, біологічних та ін. процесів моделюються задачами з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Такими умовами, зокрема, є інтегральні умови, які можна трактувати як вимірювання середніх значень розв'язку (локальні умови трактуються як вимірювання в окремих точках).

Вивченню задач з інтегральними умовами для рівнянь із частинними похідними присвячено велику кількість робіт (див., наприклад, [1–10] і бібліографію там).

Ці задачі, взагалі, є некоректними за Адамаром, а їх розв'язність у відповідних просторах функцій пов'язана з оцінками знизу малих знаменників складної нелінійної структури [11, 12].

Задача знаходження майже періодичних за просторовими координатами розв'язків системи рівнянь динамічної теорії пружності [13, с. 175] із умовами за часовою змінною, що є лінійними комбінаціями інтегральних умов типу моментів та локальних крайових умов на часовому інтервалі  $[0, T]$  вивчалася у роботі [14]. Задачу Коші для цієї системи розглянуто у роботах [15, 16].

У цій роботі вивчається задача з інтегро-крайовими умовами за часовою змінною на

$[0, T]$  для узагальненої системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій.

Постановку задачі зроблено у першому пункті роботи, зведення її до задачі для звичайного диференціального рівняння з параметром — у другому пункті, дослідження останньої задачі — у третьому пункті. У четвертому пункті проводиться побудова та оцінювання розв'язку вихідної задачі. Шостий пункт присвячений формулюванню і доведенню теорем про умови розв'язності задачі у шкалах просторів майже періодичних функцій; при цьому використовуються допоміжні леми, а також оцінки та співвідношення з п'ятого пункту. Завершується робота пунктом висновків.

**1. Постановка задачі.** У цьому пункті введено область, у якій розглядається задача, систему рівнянь з частинними похідними (систему Ляме) та інтегро-крайові умови, простори майже періодичних функцій і означення розв'язку.

В області  $Q = [0, T] \times \mathbb{R}^p$ ,  $p \in \mathbb{N}$ ,  $T > 0$ , змінних  $(t, x) = (t, x_1, \dots, x_p)$  розглядається задача про знаходження майже періодичного (за векторною змінною  $x$ ) зі спектром

$$M = \{\mu_k = (\mu_{k1}, \dots, \mu_{kp}) \in \mathbb{R}^p : k \in \mathbb{Z}^p\}$$

розв'язку системи рівнянь з частинними похідними

$$\sigma \partial_t^2 u = \mu^* \partial_x \partial_x^\dagger u + (\lambda^* + \mu^*) \partial_x^\dagger \partial_x u, \quad (1)$$

який задовольняє інтегро-крайові умови на відрізьку  $[0, T]$

$$\begin{aligned} \alpha_1 u(0, x) + \beta_1 \int_0^T \frac{t^{r_1}}{r_1!} u(t, x) dt &= \varphi_1(x), \\ \alpha_2 u(T, x) + \beta_2 \int_0^T \frac{t^{r_2}}{r_2!} u(t, x) dt &= \varphi_2(x), \end{aligned} \quad (2)$$

де  $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ ,  $\partial_x = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_p})$ ,  $\partial_t = \frac{\partial}{\partial t}$ , параметри системи  $\sigma$ ,  $\lambda^*$ ,  $\mu^*$  — додатні числа, векторні параметри

$$\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2), \quad \vec{\beta} = (\beta_1, \beta_2)$$

умов (2) є комплексними, а векторний параметр  $\vec{r} = (r_1, r_2)$  — цілочисловий, зокрема  $\|\vec{\alpha}\| > 0$ ,  $\|\vec{\beta}\| > 0$ ,  $r_1 \geq 0$ ,  $r_2 \geq 0$ ,  $\dagger$  — операція транспонування,  $\|\cdot\|$  — евклідова норма.

Задані функції  $\varphi_1$  і  $\varphi_2$  та шуканий розв'язок  $u$  — вектори розміру  $p$ .

У частинному випадку  $p = 3$  система (1) називається системою Ляме [13, 14], що описує напружений стан ізотропного однорідного пружного тіла у переміщеннях, де  $\sigma$  — густина середовища,  $\lambda^*$ ,  $\mu^*$  — коефіцієнти Ляме,  $t$  — час,  $x$  — просторова точка.

Якщо  $\vec{\beta} = 0$ , то функції  $\varphi_1$  і  $\varphi_2$  в умовах (2) можна вважати вимірюванням функції  $u = u(t, \cdot)$  у крайніх точках відрізьку  $[0, T]$ , для протилежного випадку вимірювання в окремих точках доповнюється інтегральними вимірюваннями моментів порядків  $r_1$  та  $r_2$  функції  $u$  на всьому відрізьку  $[0, T]$ .

Якщо  $\vec{\alpha} = 0$ , то точкові вимірювання не проводяться.

Розв'язок задачі (1), (2) шукаємо у вигляді функції змінної  $t$  зі значеннями у шкалі  $\{\mathbf{H}_M^q\}_{q \in \mathbb{R}}$  гільбертових просторів  $\mathbf{H}_M^q$  майже періодичних зі спектром  $M$  функцій [14], отриманих поповненням множини  $\mathbf{H}_M$  тригонометричних векторних многочленів

$$\begin{aligned} v(x) &= \sum v_k \exp(i\mu_k x) \equiv \\ &\equiv \sum v_k \exp(i\mu_{k1}x_1 + \dots + i\mu_{kp}x_p), \end{aligned}$$

за нормою

$$\|v; \mathbf{H}_M^\alpha\| = \left( \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \|v_k\|^2 (1 + \|\mu_k\|^2)^\alpha \right)^{1/2},$$

де  $\mu_k = (\mu_{k1}, \dots, \mu_{kp}) \in M$ ,  $\|\cdot\|$  — евклідова норма. На спектр  $M$  майже періодичних функцій зі шкали просторів  $\mathbf{H}_M^\alpha$  накладаємо умову неповторюваності ( $\mu_{\tilde{k}} \neq \mu_{\tilde{k}}$  у разі  $\tilde{k} \neq \tilde{k}$ ) елементів спектру і умову зростання

$$d_1 \|k\|^{\theta_1} \leq \|\mu_k\| \leq d_2 \|k\|^{\theta_2} \quad (3)$$

з дійсними параметрами  $\vec{d} = (d_1, d_2)$  і  $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2)$ , де  $0 < d_1 \leq d_2$ ,  $0 < \theta_1 \leq \theta_2$  (звідси маємо  $\mu_0 = 0$ ).

Позначимо  $\mathbf{H}_M^{2,\alpha}$  простір таких функцій  $u = u(t, x)$ , що  $\partial_t^j u \in \mathbf{C}([0, T]; \mathbf{H}_M^{\alpha-j})$ , і вважаємо, що

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,\alpha}\|^2 = \sum_{j=0}^2 \|\partial_t^j u; \mathbf{C}([0, T]; \mathbf{H}_M^{\alpha-j})\|^2.$$

**Означення 1.** Розв'язком задачі (1), (2) вважаємо функцію  $u \in \mathbf{C}^2([0, T]; \mathbf{H}_M)$ , де простір  $\mathbf{H}_M$  спряжений до простору  $\mathbf{H}_M$ , яка на  $[0, T]$  задовольняє рівняння (1) і умови (2) у просторі  $\mathbf{H}_M$  та належить до простору  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ ,  $q \in \mathbb{R}$ .

З означення випливає, що включення

$$\{\varphi_1, \varphi_2\} \subset \mathbf{H}_M^q \quad (4)$$

є необхідною умовою існування розв'язку задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ .

**2. Зведення до звичайних диференціальних рівнянь.** Якщо  $u$  — розв'язок задачі (1), (2), то

$$u \equiv u_{\vec{\alpha}, \vec{\beta}} = \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} u_k(t) e^{i(\mu_k, x)} \quad (5)$$

і  $u_k \in \mathbf{C}^2[0, T]$  для кожного  $k \in \mathbb{Z}^p$  та є розв'язком такої задачі:

$$\sigma u_k'' + \mu^* \|\mu_k\|^2 u_k + (\lambda^* + \mu^*) \mu_k^\dagger \mu_k u_k = 0, \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 u_k(0) + \beta_1 \int_0^T \frac{t^{r_1}}{r_1!} u_k(t) dt &= \varphi_{1k}, \\ \alpha_2 u_k(T) + \beta_2 \int_0^T \frac{t^{r_2}}{r_2!} u_k(t) dt &= \varphi_{2k}, \end{aligned} \quad (7)$$

де  $' = d/dt$ ,  $\varphi_{1k}, \varphi_{2k}$  — коефіцієнти Фур'є, зокрема  $\varphi_j = \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \varphi_{jk} e^{i(\mu_k, x)}$ ,  $j = 1, 2$ .

Перетворимо рівняння (6). Нехай матриця перестановок  $P_k$  визначена рівністю

$$P_k \mu_k^\dagger = (0, \nu_k)^\dagger,$$

де вектор  $\nu_k = (\nu_{k1}, \dots, \nu_{kp_k})$ ,  $1 \leq p_k \leq p$ , складено з ненульових елементів вектора  $\mu_k$ , упорядкованих за зростанням, а саме

$$|\nu_{k1}| \leq |\nu_{k2}| \leq \dots \leq |\nu_{kp_k}|,$$

а  $P_0$  — одинична матриця  $I_p$  порядку  $p$ .

Очевидно, що  $\|\mu_0\| = 0$ ,  $\mu_0^\dagger \mu_0 = 0$ ,

$$P_k \mu_k^\dagger \mu_k P_k^\dagger = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \nu_k^\dagger \nu_k \end{pmatrix}, & \text{якщо } p_k < p, \\ \nu_k^\dagger \nu_k, & \text{якщо } p_k = p, \end{cases}$$

та  $\|\mu_k\| = \|\nu_k\| > 0$  для  $k \neq 0$ , тому отримуємо рівняння  $(P_0 u_0)'' = 0$  для  $k = 0$ , а для  $k \neq 0$  рівняння

$$(P_k u_k)'' + \gamma_0^2 \|\mu_k\|^2 P_k u_k + (\gamma_1^2 - \gamma_0^2) \|\mu_k\|^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \nu_k^\dagger \nu_k \end{pmatrix} P_k u_k = 0,$$

де  $0 < \gamma_0^2 = \mu^*/\sigma < \gamma_1^2 = (\lambda^* + 2\mu^*)/\sigma$ .

Ранг симетричної матриці  $\nu_k^\dagger \nu_k$ ,  $k \neq 0$ , дорівнює одиниці, вона має порядок  $p_k$ , просту структуру і додатне власне значення  $\|\mu_k\|^2$ . Матрицю  $H_k$  її власних векторів таку, що

$$\nu_k^\dagger \nu_k H_k = H_k \text{diag}(0, \dots, 0, \|\mu_k\|^2)$$

і  $1 \leq \det H_k \leq p_k \leq p$ , задає формула

$$H_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \frac{\nu_{k1}}{\nu_{kp_k}} \\ -\frac{\nu_{k1}}{\nu_{k2}} & 1 & \dots & 0 & \frac{\nu_{k2}}{\nu_{kp_k}} \\ 0 & -\frac{\nu_{k2}}{\nu_{k3}} & \dots & 0 & \frac{\nu_{k3}}{\nu_{kp_k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \frac{\nu_{k,p_k-1}}{\nu_{kp_k}} \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{\nu_{k,p_k-1}}{\nu_{kp_k}} & 1 \end{pmatrix}.$$

Матриця  $H_k$  є добутком нижньотрикутної матриці, яка відрізняється від одиничної  $I_{p_k}$  елементами

$$-\frac{\nu_{k1}}{\nu_{k2}}, -\frac{\nu_{k2}}{\nu_{kp_k}}, \dots, -\frac{\nu_{k,p_k-1}}{\nu_{kp_k}}$$

піддіагонали, і верхньотрикутної, яка відрізняється від одиничної останнім стовпцем

$$\left( -\frac{\nu_{k1}^2}{\nu_{k1}\nu_{kp_k}}, -\frac{\nu_{k1}^2 + \nu_{k2}^2}{\nu_{k2}\nu_{kp_k}}, \dots, -\frac{\nu_{k1}^2 + \dots + \nu_{k,p_k-1}^2}{\nu_{k,p_k-1}\nu_{kp_k}}, \frac{\|\mu_k\|^2}{\nu_{kp_k}^2} \right)^\dagger.$$

Тому  $H_k^{-1}$  є добутком (блочної) матриці

$$\begin{pmatrix} I_{p_k-1} & \left( \sum_{\alpha=1}^j \frac{-\nu_{k\alpha}^2}{\nu_{kj}\|\mu_k\|} \right)_{j=1, \dots, p_k-1} \\ 0 & \nu_{kp_k}/\|\mu_k\| \end{pmatrix}$$

і (блочної) матриці

$$\begin{pmatrix} \tilde{H}_k^{-1} & 0 \\ (\nu_{kj}/\|\mu_k\|)_{j=1, \dots, p_k-1} & \nu_{kp_k}/\|\mu_k\| \end{pmatrix},$$

в якій  $\tilde{H}_k^{-1}$  є нижньотрикутною матрицею порядку  $p_k - 1$  з ненульовими елементами  $\nu_{k\beta}/\nu_{k\alpha}$ , де  $1 \leq \beta < \alpha \leq p_k - 1$

Елементи матриці  $H_k^{-1}$  обмежені за модулем числом  $p_k$ , а матриці  $H_k$  — одиницею.

Вектор  $v_k = (v_{k1}, \dots, v_{kp})^\dagger$ ,  $k \in \mathbb{Z}^p$ , нових невідомих введемо за формулою

$$v_k = Q_k u_k, \quad (8)$$

де  $Q_0 = I_p$ ,  $Q_k = \begin{pmatrix} I_{p-p_k} & 0 \\ 0 & H_k^{-1} \end{pmatrix} P_k$  для  $p_k < p$ , і  $Q_k = H_k^{-1} P_k$  для  $p_k = p$ , тоді для компонент вектора  $v_k$  отримуємо задачу

$$\begin{aligned} v_{kj}'' + \gamma_0^2 \|\mu_k\|^2 v_{kj} &= 0, \quad j = 1, \dots, p-1, \\ v_{kp}'' + \gamma_1^2 \|\mu_k\|^2 v_{kp} &= 0, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\alpha_1 v_{kj}(0) + \beta_1 \int_0^T \frac{t^{r_1}}{r_1!} v_{kj}(t) dt = \psi_{1k}^j, \quad (10)$$

$$\alpha_2 v_{kj}(T) + \beta_2 \int_0^T \frac{t^{r_2}}{r_2!} v_{kj}(t) dt = \psi_{2k}^j,$$

причому  $j = 1, \dots, p$ ,

$$(\psi_{\beta k}^1, \dots, \psi_{\beta k}^p)^\dagger = \psi_{\beta k} = Q_k \varphi_{\beta k}, \quad \beta = 1, 2.$$

Отже, дослідження задачі (9), (10) звелось до побудови і дослідження розв'язку задачі

$$\begin{cases} v'' + \gamma^2 v = 0, \\ \alpha_1 v(0) + \beta_1 \int_0^T \frac{t^{r_1}}{r_1!} v(t) dt = \psi_1, \\ \alpha_2 v(T) + \beta_2 \int_0^T \frac{t^{r_2}}{r_2!} v(t) dt = \psi_2 \end{cases} \quad (11)$$

для довільних пар  $\{\psi_1, \psi_2\} \subset \mathbb{C}$  і  $\gamma \geq 0$ , а також до вивчення його асимптотики для великих  $\gamma$ .

**3. Дослідження задачі для звичайного диференціального рівняння.** Виберемо фундаментальні системи розв'язків рівняння  $v'' + \gamma^2 v = 0$ , зокрема  $\{1, t\}$  для  $\gamma = 0$  і  $\{e^{i\gamma t}, e^{-i\gamma t}\}$  для  $\gamma \neq 0$ . Тоді у позначеннях

$$\mathcal{I}_{\pm}(r) \equiv \mathcal{I}_{\pm}(r, \gamma) = \int_0^T \frac{t^r}{r!} e^{\pm i\gamma t} dt, \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{t,\pm}(r) &= e^{i\gamma t} \mathcal{I}_-(r) \pm e^{-i\gamma t} \mathcal{I}_+(r) = \\ &= 2 \int_0^T \frac{\tau^r}{r!} \begin{cases} \cos \gamma(t - \tau) \\ i \sin \gamma(t - \tau) \end{cases} d\tau, \quad (13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{\pm}(\vec{r}) &= \mathcal{I}_+(r_1) \mathcal{I}_-(r_2) \pm \mathcal{I}_-(r_1) \mathcal{I}_+(r_2) = \\ &= \int_0^T \frac{t^{r_1}}{r_1!} \mathcal{I}^{t,\pm}(r_2) dt = \pm \int_0^T \frac{t^{r_2}}{r_2!} \mathcal{I}^{t,\pm}(r_1) dt, \quad (14) \end{aligned}$$

де  $r, r_1, r_2$  — невід'ємні цілі числа, отримуємо визначники  $\Delta(\gamma)$ ,  $\gamma \geq 0$ , задачі (11)

$$\begin{aligned} \Delta(0) &= \alpha_1 \alpha_2 T + \\ &+ \alpha_1 \beta_2 \frac{(r_2 + 1) T^{r_2 + 2}}{(r_2 + 2)!} + \alpha_2 \beta_1 \frac{T^{r_1 + 2}}{(r_1 + 2)!} + \\ &+ \beta_1 \beta_2 \frac{(r_2 - r_1) T^{r_1 + r_2 + 3}}{(r_1 + 2)! (r_2 + 2)!}, \quad (15) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta(\gamma) &= \\ &= \begin{vmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \mathcal{I}_+(r_1) & \alpha_1 + \beta_1 \mathcal{I}_-(r_1) \\ \alpha_2 e^{i\gamma T} + \beta_2 \mathcal{I}_+(r_2) & \alpha_2 e^{-i\gamma T} + \beta_2 \mathcal{I}_-(r_2) \end{vmatrix} = \\ &= -2i\alpha_1 \alpha_2 \sin \gamma T + \alpha_1 \beta_2 \mathcal{I}^{0,-}(r_2) - \\ &- \alpha_2 \beta_1 \mathcal{I}^{T,-}(r_1) + \beta_1 \beta_2 \mathcal{I}^-(\vec{r}), \quad (16) \end{aligned}$$

які є білінійними формами аргументів  $\alpha_1, \beta_1$  та  $\alpha_2, \beta_2$  і цілими функціями щодо  $T$  та  $\gamma$ .

Розв'язок  $v = v(t) = v_{\vec{\alpha}, \vec{\beta}}(t, \gamma)$  задачі (11) існує для довільних чисел  $\psi_1 \in \mathbb{C}$  і  $\psi_2 \in \mathbb{C}$  лише тоді, коли  $\Delta(\gamma) \neq 0$ ; він єдиний і має вигляд

$$v(t) = \frac{g_1(t, \gamma)}{\Delta(\gamma)} \psi_1 + \frac{g_2(t, \gamma)}{\Delta(\gamma)} \psi_2, \quad (17)$$

де

$$g_1(t, \gamma) = 2i\alpha_2 \sin \gamma(t - T) + \beta_2 \mathcal{I}^{t,-}(r_2), \quad (18)$$

$$g_2(t, \gamma) = -2i\alpha_1 \sin \gamma t - \beta_1 \mathcal{I}^{t,-}(r_1) \quad (19)$$

при  $\gamma \neq 0$  і

$$\begin{aligned} g_1(t, 0) &= \alpha_2(T - t) + \\ &+ \beta_2 \frac{T^{r_2 + 2}}{(r_2 + 2)!} (r_2 + 1 - (r_2 + 2) \frac{t}{T}), \quad (20) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2(t, 0) &= \alpha_1 t - \\ &- \beta_1 \frac{T^{r_1 + 2}}{(r_1 + 2)!} (r_1 + 1 - (r_1 + 2) \frac{t}{T}), \quad (21) \end{aligned}$$

зокрема для  $\gamma > 0$

$$v_{\vec{\alpha}, \vec{0}}(t) = \frac{\sin \gamma t}{\sin \gamma T} \frac{\psi_2}{\alpha_2} - \frac{\sin \gamma(t - T)}{\sin \gamma T} \frac{\psi_1}{\alpha_1}, \quad (22)$$

$$v_{\vec{0}, \vec{\beta}}(t) = \frac{\mathcal{I}^{t,-}(r_2)}{\mathcal{I}^-(\vec{r})} \frac{\psi_1}{\beta_1} - \frac{\mathcal{I}^{t,-}(r_1)}{\mathcal{I}^-(\vec{r})} \frac{\psi_2}{\beta_2}. \quad (23)$$

Використовуючи для  $\gamma$  два значення

$$\gamma = \gamma_0 \|\mu_k\| \quad \text{і} \quad \gamma = \gamma_1 \|\mu_k\|, \quad k \neq 0,$$

з рівності (17) для компонент розв'язку  $v_{kj} = v_{kj}(t)$  задачі (9), (10) маємо формули

$$\begin{aligned} v_{kj}(t) &= \\ &= \frac{g_1(t, \gamma_0 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_0 \|\mu_k\|)} \psi_{1k}^j + \frac{g_2(t, \gamma_0 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_0 \|\mu_k\|)} \psi_{2k}^j \quad (24) \end{aligned}$$

для індексів  $j = 1, \dots, p - 1$  і

$$\begin{aligned} v_{kp}(t) &= \\ &= \frac{g_1(t, \gamma_1 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_1 \|\mu_k\|)} \psi_{1k}^p + \frac{g_2(t, \gamma_1 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_1 \|\mu_k\|)} \psi_{2k}^p. \quad (25) \end{aligned}$$

#### 4. Побудова розв'язку задачі (1), (2).

З рівностей (24) і (25) для розв'язків  $v_{kj}$ , де  $k \neq 0$ , задачі (9), (10) за формулою (8) будемо вектор  $u_k$  — розв'язок задачі (6), (7):

$$\begin{aligned} u_k(t) &= Q_k^{-1} \sum_{j=1}^2 \text{diag} \left( \frac{g_j(t, \gamma_0 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_0 \|\mu_k\|)} \right) I_{p-1}, \\ &\frac{g_j(t, \gamma_1 \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_1 \|\mu_k\|)} \psi_{jk} = \sum_{j,l=1}^2 \frac{g_j(t, \gamma_l \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)} \Pi_k^l \varphi_{jk}, \end{aligned}$$

тут  $\Pi_k^1 \equiv \Pi(\mu_k)$  — проектор на одновимірний підпростір, заданий вектором  $\mu_k$ , тобто

$$\Pi_k^1 = \frac{\mu_k^\dagger \mu_k}{\|\mu_k\|^2}, \text{ а також } \Pi_k^0 = I_p - \Pi(\mu_k),$$

а за формулою (5) будемо розв'язок задачі (1), (2):

$$u = \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} e^{i(\mu_k, x)} \sum_{j,l=1}^2 \frac{g_j(t, \gamma_l \|\mu_k\|)}{\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)} \Pi_k^l \varphi_{jk}, \quad (26)$$

де

$$g_1(t, \gamma_l \|\mu_k\|) = 2i\alpha_2 \sin \gamma_l \|\mu_k\| (t - T) + \beta_2 \mathcal{I}^{t,-}(r_2, \gamma_l \|\mu_k\|), \quad (27)$$

$$g_2(t, \gamma_l \|\mu_k\|) = -2i\alpha_1 \sin \gamma_l \|\mu_k\| t - \beta_1 \mathcal{I}^{t,-}(r_1, \gamma_l \|\mu_k\|), \quad (28)$$

для довільного  $k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$  і  $l = 0, 1$ , або

$$g_1(t, \gamma_l \|\mu_k\|) = 2i\alpha_2 \sin \gamma_l \|\mu_k\| (t - T) + 2i\beta_2 \int_0^T \frac{\tau^{r_2}}{r_2!} \sin \gamma_l \|\mu_k\| (t - \tau) d\tau, \quad (29)$$

$$g_2(t, \gamma_l \|\mu_k\|) = -2i\alpha_1 \sin \gamma_l \|\mu_k\| t - 2i\beta_1 \int_0^T \frac{\tau^{r_1}}{r_1!} \sin \gamma_l \|\mu_k\| (t - \tau) d\tau. \quad (30)$$

Якщо  $k = 0$ , то відповідний доданок у сумі (26) зводиться до такого вигляду:

$$(g_1(t, 0)\varphi_{10} + g_2(t, 0)\varphi_{20})/\Delta(0).$$

Для частинного випадку  $\vec{\beta} = 0$ , коли

$\Delta(0) = \alpha_1 \alpha_2 T \neq 0$  і  $\Delta(\gamma) = -2i\alpha_1 \alpha_2 \sin \gamma T$ , отримуємо необхідну умову існування розв'язку

$$\forall k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\} \quad \sin \gamma_0 \|\mu_k\| T \sin \gamma_1 \|\mu_k\| T \neq 0,$$

за якої формула (26) має вигляд

$$u_{\vec{\alpha}, \vec{0}} = \frac{T-t}{T} \frac{\varphi_{10}}{\alpha_1} + \frac{t}{T} \frac{\varphi_{20}}{\alpha_2} + \sum_{k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}} e^{i(\mu_k, x)} \times \left( \sum_{l=1}^2 \frac{\sin \gamma_l \|\mu_k\| (T-t)}{\alpha_1 \sin \gamma_l \|\mu_k\| T} \Pi_k^l \varphi_{1k} + \sum_{l=1}^2 \frac{\sin \gamma_l \|\mu_k\| t}{\alpha_2 \sin \gamma_l \|\mu_k\| T} \Pi_k^l \varphi_{2k} \right). \quad (31)$$

У випадку  $\vec{\alpha} = 0$ , коли

$$\Delta(0) = \beta_1 \beta_2 \frac{(r_2 - r_1) T^{r_1+r_2+3}}{(r_1+2)!(r_2+2)!},$$

$$\Delta(\gamma) = \beta_1 \beta_2 \mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma),$$

отримуємо необхідну умову існування розв'язку:  $r_2 \neq r_1$  і  $\forall k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$

$$\mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_0 \|\mu_k\|) \mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_1 \|\mu_k\|) \neq 0,$$

за якої маємо формулу

$$u_{\vec{0}, \vec{\beta}} = \frac{(r_2+1)(T-t) - t(r_1+2)!}{r_2 - r_1} \frac{\varphi_{10}}{\beta_1 T^{r_1+2}} - \frac{(r_1+1)(T-t) - t(r_2+2)!}{r_2 - r_1} \frac{\varphi_{20}}{\beta_2 T^{r_2+2}} + \sum_{k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}} e^{i(\mu_k, x)} \left( \sum_{l=1}^2 \frac{\mathcal{I}^{t,-}(r_2, \gamma_l \|\mu_k\|)}{\beta_1 \mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|)} \Pi_k^l \varphi_{1k} - \sum_{l=1}^2 \frac{\mathcal{I}^{t,-}(r_1, \gamma_l \|\mu_k\|)}{\beta_2 \mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|)} \Pi_k^l \varphi_{2k} \right). \quad (32)$$

У разі  $\vec{\beta} = 0$  (задача Діріхле) формальний розв'язок задачі (1), (2) може бути записаний також у вигляді

$$u_{\vec{\alpha}, \vec{0}} = \frac{T-t}{T} \frac{\varphi_{10}}{\alpha_1} + \frac{t}{T} \frac{\varphi_{20}}{\alpha_2} + \sum_{k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}} e^{i(\mu_k, x)} \times \left( \sum_{l=1}^2 \frac{\sin \gamma_l \|\mu_k\| (T-t)}{\alpha_1 \sin(\gamma_l \|\mu_k\| T - m_{1k} \pi)} \Pi_k^l \varphi_{1k} + \sum_{l=1}^2 \frac{\sin \gamma_l \|\mu_k\| t}{\alpha_2 \sin(\gamma_l \|\mu_k\| T - m_{1k} \pi)} \Pi_k^l \varphi_{2k} \right), \quad (33)$$

де  $m_{lk}$  — невід'ємні цілі числа і

$$|\gamma_l \|\mu_k\| T - m_{lk} \pi| \leq \frac{\pi}{2}, \quad l = 0, 1. \quad (34)$$

Тут використано властивість: для довільного числа  $y \in \mathbb{R}$  існує таке число  $m \in \mathbb{Z}$ , що

$$\sin \pi y = (-1)^m \sin \pi(y - m) \quad \text{і} \quad |y - m| \leq \frac{1}{2}.$$

Аналогічно, у формулі (16) для визначників  $\Delta(\gamma_l \|\mu_k\| T)$ , де  $l = 1, 2$ ,  $k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$ , замість виразів  $\sin(\gamma_l \|\mu_k\| T)$  можна використовувати відповідно  $\sin(\gamma_l \|\mu_k\| T - m_{lk} \pi)$ .

Норму розв'язку (26) дає формула

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 = \sum_{\alpha=0}^2 \max_{0 \leq t \leq T} \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{q-\alpha} \times \\ \times \sum_{j,l=1}^2 \left( \frac{|d^\alpha g_j(t, \gamma_l \|\mu_k\|)|/dt^\alpha|^2}{|\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)|^2} \|\Pi_k^l \varphi_{jk}\|^2 \right),$$

з якої отримуємо оцінку

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \sum_{j,l=1}^2 (1 + \|\mu_k\|^2)^q \times \\ \times \sum_{\alpha=0}^2 \frac{G_{j\alpha}(\gamma_l, \|\mu_k\|)}{(1 + \|\mu_k\|^2)^\alpha} \frac{\|\Pi_k^l \varphi_{jk}\|^2}{|\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)|^2}, \quad (35)$$

де для  $\alpha \in \{0, 1, 2\}$  і  $\{j, l\} \subset \{1, 2\}$  позначено

$$G_{j\alpha}(\gamma_l, \|\mu_k\|) = \max_{0 \leq t \leq T} \left| \frac{d^\alpha g_j(t, \gamma_l \|\mu_k\|)}{dt^\alpha} \right|^2.$$

**5. Допоміжні оцінки та співвідношення.** Для встановлення умов існування та єдиності розв'язку задачі (1), (2) дамо необхідні оцінки і рекурентні співвідношення для величин  $\mathcal{I}_\pm(r)$ ,  $\mathcal{I}^{t,\pm}(r)$  та  $\mathcal{I}^\pm(\vec{r})$ .

Справджуються такі (порядків  $\sigma_0$  і  $\sigma_1, \sigma_2$ ) рекурентні співвідношення:

$$\mathcal{I}_\pm(r) = \left(\frac{\pm i}{\gamma}\right)_0^\sigma \mathcal{I}_\pm(r - \sigma_0) - \\ - e^{\pm i\gamma T} \sum_{\alpha=r-\sigma_0+1}^r \left(\frac{\pm i}{\gamma}\right)^{r-\alpha+1} \frac{T^\alpha}{\alpha!}, \quad (36)$$

$$\mathcal{I}^{t,\pm}(r) = \left(\frac{-i}{\gamma}\right)_0^\sigma \mathcal{I}^{t,\pm(-1)\sigma}(r - \sigma_0) - \\ - \sum_{\alpha=r-\sigma_0+1}^r \left(\frac{-i}{\gamma}\right)^{r-\alpha+1} \frac{T^\alpha}{\alpha!} \mathcal{I}^{t-T, \mp(-1)^{r-\alpha}}(-1),$$

$$\mathcal{I}^\pm(\vec{r}) = (-1)^{\sigma_2} \left(\frac{i}{\gamma}\right)^{\sigma_1+\sigma_2} \times \\ \times \mathcal{I}^{\pm(-1)^{\sigma_1-\sigma_2}}(r_1 - \sigma_1, r_2 - \sigma_2) + \\ + \left(\frac{-i}{\gamma}\right)^{\sigma_2+1} \sum_{\alpha_1=r_1-\sigma_1+1}^{r_1} \left(\frac{i}{\gamma}\right)^{r_1-\alpha_1} \frac{T^{\alpha_1}}{\alpha_1!} \times \\ \times \mathcal{I}^{T, \mp(-1)^{\sigma_2+r_1-\alpha_1}}(r_2 - \sigma_2) \pm \\ \pm \left(\frac{-i}{\gamma}\right)^{\sigma_1+1} \sum_{\alpha_2=r_2-\sigma_2+1}^{r_2} \left(\frac{i}{\gamma}\right)^{r_2-\alpha_2} \frac{T^{\alpha_2}}{\alpha_2!} \times \\ \times \mathcal{I}^{T, \mp(-1)^{\sigma_1+r_2-\alpha_2}}(r_1 - \sigma_1) + \\ + \frac{1}{\gamma^2} \sum_{\substack{\alpha_1=r_1-\sigma_1+1 \\ \alpha_2=r_2-\sigma_2+1}}^{r_1, r_2} \left( (-1)^{r_2-\alpha_2} \pm (-1)^{r_1-\alpha_1} \right) \times \\ \times \left(\frac{i}{\gamma}\right)^{r_1+r_2-\alpha_1-\alpha_2} \frac{T^{\alpha_1+\alpha_2}}{\alpha_1! \alpha_2!} \quad (38)$$

(якщо  $\sigma_0 = 0$ , то суму  $\sum_{\alpha=r-\sigma_0+1}^r$  замінюємо нулем; аналогічно для порядків  $\sigma_1$  та  $\sigma_2$ ), причому  $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $\mathcal{I}_\pm(-1) = 1$ ,

$$\mathcal{I}^{t,+}(-1) = 2 \cos \gamma t, \quad \mathcal{I}^{t,-}(-1) = 2i \sin \gamma t,$$

у формулах (36)–(38) вважаємо  $t \in [0, T]$ ,

$$\sigma_0=0, 1, \dots, r+1, \quad \sigma_j=0, 1, \dots, r_j+1, \quad j=1, 2.$$

Також справджуються при  $t \in [0, T]$  оцінки

$$|\mathcal{I}_\pm(r)| \leq \frac{2 T^r}{\gamma r!}, \quad r \geq 0, \quad (39)$$

$$\frac{1}{2\gamma} \frac{T^r}{r!} \leq |\mathcal{I}_\pm(r)| \leq \frac{3}{2\gamma} \frac{T^r}{r!}, \quad \gamma \geq \frac{4r}{T}, \quad r \geq 1, \quad (40)$$

$$|\mathcal{I}^{t,\pm}(r)| \leq \frac{4 T^r}{\gamma r!}, \quad r \geq 0, \quad (41)$$

$$|\mathcal{I}^{t,\pm}(r)| \leq \frac{3 T^r}{\gamma r!}, \quad \gamma \geq \frac{4r}{T}, \quad r \geq 1, \quad (42)$$

$$|\mathcal{I}^\pm(\vec{r})| \leq \frac{8 T^{r_1+r_2}}{\gamma^2 r_1! r_2!}, \quad r_1 \geq 0, \quad r_2 \geq 0. \quad (43)$$

Рекурентне співвідношення (36) отримується інтегруванням частинами у формулі (12), рекурентне співвідношення (37) — підстановкою (36) у формулу (13), рекурентне співвідношення (38) — підстановкою (36) (при  $\sigma_0 = \sigma_1$  для  $\mathcal{I}_\pm(r_1)$  і при  $\sigma_0 = \sigma_2$  для  $\mathcal{I}_\pm(r_2)$ ) у формулу (14); нерівності (39) і (40) дістаємо з оцінки

$$(37) \quad |\mathcal{I}_\pm(r-1)| \leq \int_0^T \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} dt = \frac{T^r}{r!}, \quad r \geq 1,$$

та формули (36) для  $\sigma_0 = 1$  і  $\sigma_0 = 2$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\pm}(r) &= \pm \frac{i}{\gamma} \left( \mathcal{I}_{\pm}(r-1) - e^{\pm i\gamma T} \frac{T^r}{r!} \right) = \\ &= -\frac{1}{\gamma^2} \left( \mathcal{I}_{\pm}(r-2) - e^{\pm i\gamma T} \left( \frac{T^{r-1}}{(r-1)!} \mp i\gamma \frac{T^r}{r!} \right) \right); \end{aligned}$$

нерівності (41) і (42) дістаємо з формули (37) для  $\sigma_0 = 1$  і  $\sigma_0 = 2$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{t,\pm}(r) &= \frac{-i}{\gamma} \left( \mathcal{I}^{t,\mp}(r-1) - \frac{T^r}{r!} \mathcal{I}^{t-T,\mp}(-1) \right) = \\ &= -\frac{1}{\gamma^2} \left( \mathcal{I}^{t,\pm}(r-2) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{T^{r-1}}{(r-1)!} \mathcal{I}^{t-T,\pm}(-1) - i\gamma \frac{T^r}{r!} \mathcal{I}^{t-T,\mp}(-1) \right); \end{aligned}$$

нерівність (43) виводимо з формул (14), (39).

**6. Умови однозначної розв'язності задачі.** Встановимо однозначну розв'язність задачі (1), (2) у двох випадках:

$$1^\circ) \alpha_1 \alpha_2 \neq 0, \quad 2^\circ) \vec{\alpha} = 0 \quad (\beta_1 \beta_2 \neq 0),$$

приймаючи таке означення розв'язності.

**Означення 2.** Задачу (1), (2) називаємо *однозначно розв'язною у шкалі просторів*  $\{\mathbf{H}_M^\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ , якщо існують такі дійсні числа  $q$  і  $q'$ , що для пари довільних функцій  $\varphi_1$  та  $\varphi_2$  з простору  $\mathbf{H}_M^{q'}$  існує єдиний розв'язок задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ .

Спочатку дамо необхідну та достатню умову однозначної розв'язності задачі (1), (2), а потім доведемо теореми про безумовну розв'язність.

Будемо вважати, що  $T$  належить відрізку  $[T_0, T_1]$ , де  $0 < T_0 < T_1 < \infty$ .

Використовуємо позначення

$$\begin{aligned} \Gamma_\gamma^\pm &= d/dT \pm i\gamma, \quad \gamma \in \mathbb{R}, \\ \Pi_\tau \varphi &= \sum_{\|\mu_k\| < \tau} \varphi_k e^{i(\mu_k, x)}, \quad \tau \in \mathbb{R}, \\ \zeta(\omega) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{\omega/2}, \quad \omega > \frac{p}{\theta_1}, \end{aligned}$$

де  $\varphi = \varphi(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \varphi_k e^{i(\mu_k, x)}$ , і наступну лему [17] про міру множини точок відрізка, у яких квазімногочлен має малі значення.

**Лема 1.** Нехай  $f$  – квазімногочлен і

$$f(y) = \sum_{j=1}^m p_j(y) e^{\lambda_j y}, \quad \lambda_j \neq \lambda_q \quad (j \neq q),$$

де  $\lambda_j \in \mathbb{C}$ ,  $|\lambda_1| \leq \dots \leq |\lambda_m|$ ,  $p_j$  – многочлен степеня  $n_j - 1$ ,  $n_j \in \mathbb{N}$ . Якщо для деяких комплексних чисел  $a_1, \dots, a_n$  і  $\delta > 0$  виконується умова

$$\forall y \in [a, b] \subset \mathbb{R} \quad |f^{(n)}(y) + \sum_{j=1}^n a_j f^{(n-j)}(y)| \geq \delta,$$

то для довільного  $\varepsilon$  з інтервалу

$$\left( 0, \frac{\delta}{2n+2} \left( 1 + \max_{1 \leq j \leq n} |a_j|^{1/j} \right)^{-n} \right)$$

справджується оцінка

$$\text{meas}\{y \in [a, b]: |f(y)| < \varepsilon\} \leq c(1 + |\lambda_m|)^n \sqrt[n]{\frac{\varepsilon}{\delta}},$$

де  $c$  може залежати лише від довжини проміжку  $[a, b]$  і чисел  $n$  та  $n_1 + \dots + n_m$ .

**Теорема 1.** Для однозначної розв'язності задачі (1), (2) необхідно і достатньо, щоб для всіх  $k \in \mathbb{Z}^p$  виконувалась умова

$$|\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)| \geq C_{0l} (1 + \|\mu_k\|^2)^{q_0/2}, \quad (44)$$

де  $q_0$  – дійсне число,  $C_{0l} > 0$  для  $l = 1, 2$ .

**Доведення. Необхідність.** Доводимо методом від супротивного: нехай умова теореми не виконується, тоді існує така послідовність векторів  $k_j^* \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$ , які не повторюються, і зростаюча послідовність натуральних чисел  $m_j$ , що для  $l^* = 0$ , або  $l^* = 1$ , виконується умова

$$\forall j \in \mathbb{N} \quad |\Delta(\gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\|)| \leq (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{-m_j/2}. \quad (45)$$

Оскільки спектр  $M$  не має скінченних точок скупчення, можемо вибрати підмножину  $J$  натуральних чисел  $j$ , для яких при  $\alpha_2 \neq 0$  і деякому  $\theta > p/\theta_1$  виконуються нерівності

$$\begin{aligned} \gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| &\geq \max \left( 1, 4 \frac{|\beta_2|}{|\alpha_2|} \frac{T^{r_2}}{r_2!} \right), \\ (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{\theta/2} &\geq \frac{8}{|\alpha_2|}. \end{aligned}$$

Для квазімногочлена  $g_1(\cdot, \gamma_l \|\mu_k\|)$  згідно з лемою 1 розглянемо для випадку  $\alpha_2 \neq 0$  функції  $h_j$ ,  $j \in J$ , такого вигляду:

$$h_j(t) = \left( \frac{d}{dt} + i\gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| \right) g_1(t, \gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\|).$$

З формул (13), (27) та (29) маємо

$$h_j(t) = 2i\gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| e^{i\gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| t} \times \\ \times (\alpha_2 e^{-i\gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| T} + \beta_2 \mathcal{I}_-(r_2)), \quad j \in J,$$

і  $|h_j(t)| \geq |\alpha_2| \gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\|$  для всіх  $t \in [0, T]$ . За лемою 1 міра множини чисел  $t \in [0, T]$ , для яких не виконується нерівність

$$|g_1(t, \gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\|)| \geq (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{-\theta/2} \quad (46)$$

для фіксованого  $j \in J$ , не перевищує числа

$$\frac{2c}{|\alpha_2|} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{-\theta/2},$$

де  $\theta > p/\theta_1$ ,  $c$  — стала з леми 1.

Зі збіжності ряду  $\sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-\theta/2}$  і леми Бореля–Кантеллі [11] випливає, що для майже всіх точок  $t \in [0, T]$  нерівність (46) виконується для всіх (крім скінченної кількості) чисел  $j \in J$ . Позначимо одну з таких точок  $t^*$ , а  $J^*$  — нескінченну підмножину  $j \in J$ , для якої виконуються нерівності (46) у точці  $t^*$  і  $m_j \geq q' - q + \theta + 1$ , де  $q, q'$  — довільні фіксовані дійсні числа.

Запишемо оцінку норми розв'язку задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$  за таких умов:

функції  $\varphi_1, \varphi_2$  належать до простору  $\mathbf{H}_M^{q'}$ , але функції

$$\sum_{j \in J^*} \Pi_{k_j^*}^l \varphi_{1k_j^*} e^{i(\mu_{k_j^*}, x)}, \quad l = 0, 1,$$

не належать до простору  $\mathbf{H}_M^{q'+1}$ , якщо  $l^* = 0$  і  $l^* = 1$  відповідно.

З формули (35), припущення (45) і оцінки (46) виводимо

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \geq \|u(t^*, \cdot); \mathbf{H}_M^q\|^2 \geq \\ \geq \sum_{j \in J^*} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{m_j+q-\theta} \|\Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*}\|^2 \geq \\ \geq \sum_{j \in J^*} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{q'+1} \|\Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*}\|^2 = \infty$$

для  $l^* = 0$  та

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \geq \|u(t^*, \cdot); \mathbf{H}_M^q\|^2 \geq \\ \geq \sum_{j \in J^*} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{q'+1} \|\Pi_{k_j^*}^1 \varphi_{1k_j^*}\|^2 = \infty$$

для  $l^* = 1$ .

Необхідність доведено для  $\alpha_2 \neq 0$ .

Якщо ж  $\alpha_2 = 0$ , то при  $\alpha_1 \neq 0$ , аналогічно встановлюємо необхідність умов теореми, розглядаючи квазіполіном  $g_2(t, \gamma_l \|\mu_k\|)$  і вибираючи функцію  $\varphi_2 \in \mathbf{H}_M^{q'} \setminus \mathbf{H}_M^{q'+1}$ .

Нарешті, якщо  $\vec{\alpha} = 0$ , то  $\beta_1 \beta_2 \neq 0$  і  $r_1 \neq r_2$ , оскільки розв'язок задачі (1), (2) неєдиний у разі  $r_1 = r_2$ . Тому залишається перевірити випадок  $0 \leq r_1 < r_2$ .

Для цього використовуємо множину

$$J_1 = \{j \in \mathbb{N}: \gamma_{l^*} \|\mu_{k_j^*}\| \geq \frac{4r_2}{T}, m_j \geq q' - q + 2\},$$

де  $q, q'$  — довільні фіксовані дійсні числа,  $l^* = 0$ , або  $l^* = 1$ , і нерівність

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \geq \|u(T, \cdot); \mathbf{H}_M^q\|^2 \geq \\ \geq |\beta_2|^2 \sum_{j \in J_1} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^q \times \\ \times \frac{|\mathcal{I}^{T,-}(r_2, \gamma_0 \|\mu_{k_j^*}\|)|^2}{|\Delta(\gamma_0 \|\mu_{k_j^*}\|)|^2} \|\Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*}\|^2.$$

За формулою (37) для  $\sigma_0 = 1$  і нерівністю (41) за умови  $\gamma_l \|\mu_k\| \geq 4r_2/T$  отримуємо оцінку

$$|\mathcal{I}^{T,-}(r_2, \gamma_l \|\mu_k\|)| \geq \frac{1}{\gamma_l \|\mu_k\|} \frac{T^{r_2}}{r_2!}, \quad r_2 \geq 1,$$

з якої випливає

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \geq \left( \frac{|\beta_2| T^{r_2}}{\gamma_0 r_2!} \right)^2 \times \\ \times \sum_{j \in J_1} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{m_j+q-1} \|\Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*}\|^2 \geq \\ \geq \left( \frac{|\beta_2| T^{r_2}}{\gamma_0 r_2!} \right)^2 \sum_{j \in J_1} (1 + \|\mu_{k_j^*}\|^2)^{q'+1} \times \\ \times \|\Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*}\|^2 = \infty,$$

тобто розв'язок не належить до простору  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ , якщо функція  $\sum_{j \in J_1} \Pi_{k_j^*}^0 \varphi_{1k_j^*} e^{i(\mu_{k_j^*}, x)}$  не належить до простору  $\mathbf{H}_M^{q'+1}$ .



Аналогічний результат є також і для випадку  $l^* = 1$ .

**Достатність.** З умови (44) випливає існування для  $k \in \mathbb{Z}^p$  і довільних правих частин єдиного розв'язку задачі (6), (7).

З правила диференціювання

$$\left(\frac{d}{dt}\right)^\alpha \begin{bmatrix} \mathcal{I}^{t,\pm}(r) \\ \mathcal{I}^{t-T,\pm}(r) \end{bmatrix} = (i\gamma)^\alpha \begin{bmatrix} \mathcal{I}^{t,\pm(-1)^\alpha}(r) \\ \mathcal{I}^{t-T,\pm(-1)^\alpha}(r) \end{bmatrix}$$

та формул (27) і (28) запишемо

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dt}\right)^\alpha \begin{bmatrix} g_1(t, \gamma_l \|\mu_k\|) \\ g_2(t, \gamma_l \|\mu_k\|) \end{bmatrix} &= (i\gamma_l \|\mu_k\|)^\alpha \times \\ &\times \begin{bmatrix} \alpha_2 \mathcal{I}^{t-T,(-1)^{\alpha+1}}(-1) + \beta_2 \mathcal{I}^{t,(-1)^{\alpha+1}}(r_2) \\ -\alpha_1 \mathcal{I}^{t,(-1)^{\alpha+1}}(-1) - \beta_1 \mathcal{I}^{t,(-1)^{\alpha+1}}(r_1) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Враховуючи формули (18)–(21) та оцінку (41) для  $k \in \mathbb{Z}^p$ ,  $l = 0, 1$ ,  $\alpha = 0, 1, 2$  маємо

$$\left| \frac{d^\alpha g_j(t, \gamma_l \|\mu_k\|)}{dt^\alpha} \right| \leq c_{1j} \gamma_l^\alpha (1 + \|\mu_k\|^2)^{\alpha/2}, \quad (47)$$

причому

$$c_{1,\omega(j)} = \max \left( 2|\alpha_j| + \frac{4|\beta_j| T^{r_j}}{\gamma_0 d_1 r_j!}, \right. \\ \left. |\alpha_j| T + |\beta_j| \frac{T^{r_j+2}}{(r_j+1)!} \right),$$

де  $\omega(1) = 2$ , а  $\omega(2) = 1$ .

Тому, підставляючи останню нерівність у (35), для довільних елементів  $\varphi_1$  і  $\varphi_2$  з простору  $\mathbf{H}_M^{q-q_0}$  встановлюємо оцінку

$$\|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 \leq \sum_{j=1}^2 \frac{C_{1j}^2}{\min_{l=0,1} C_{0l}^2} \|\varphi_j; \mathbf{H}_M^{q-q_0}\|^2 < \infty,$$

де  $C_{1j} = c_{1j} \sqrt{1 + \gamma_1^2 + \gamma_l^4}$ .

Отже, за умови (44) задача (1), (2) однозначно розв'язна у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ , а її розв'язок неперервно залежить від правих частин задачі з простору  $\mathbf{H}_M^{q-q_0}$ .

З формул (35), (47) маємо оцінку

$$\begin{aligned} \|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \sum_{\alpha=0}^2 \frac{c_{1j}^2 \gamma_l^{2\alpha}}{|\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)|^2} \times \\ &\times (1 + \|\mu_k\|^2)^q \sum_{j=1}^2 \|\varphi_{jk}\|^2, \quad (48) \end{aligned}$$

яка потребує лише дослідження квазіполіномів  $\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|) = \Delta_{\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{r}, T}(\gamma_l \|\mu_k\|)$  за змінною  $T$  на відрізку  $[T_0, T_1]$ , де  $0 < T_0 < T_1$ .

У разі  $T = T_0 = 0$  задача (1), (2) очевидно не має єдиного розв'язку

$$(\det \Delta_{\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{r}, 0}(\gamma_l \|\mu_k\|) = \det \Delta_{\vec{\alpha}, \vec{0}, \vec{0}, 0}(\gamma_l \|\mu_k\|) = 0).$$

У залежності від векторів  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$ ,  $\vec{r}$  встановимо оцінку (44) з деякими сталими  $C_0$  і  $q_0$ . Спостерігаємо виникнення проблеми малих знаменників при деяких значеннях  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$ ,  $\vec{r}$  і її відсутність для інших значень, зокрема, з оцінок (41)–(43) випливає, що

$$\Delta(\gamma) + 2i\alpha_1\alpha_2 \sin \gamma T \xrightarrow{\gamma \rightarrow \infty} 0,$$

а, отже,  $\Delta(\gamma_j) \xrightarrow{\gamma_j \rightarrow \infty} 0$  на підпоследовностях  $\gamma_j$ , для яких  $\sin \gamma_j T \xrightarrow{\gamma_j \rightarrow \infty} 0$ .

Доцільно розбити дослідження знаменників  $\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)$  за значенням вектора  $\vec{\alpha}$  (розглядатимемо випадки  $\alpha_1\alpha_2 \neq 0$  і  $\vec{\alpha} = 0$ ).

**Лема 2.** Нехай  $\alpha_1\alpha_2 \neq 0$ , тоді для довільного числа  $\varepsilon_{lk} \in \left(0, \frac{|\alpha_1\alpha_2|\gamma_0}{4(\gamma_0 + \gamma_1)}\right)$ , де  $l \in \{0, 1\}$ , вектор  $k \in \mathbb{Z}^p$  задовольняє умову  $\|\mu_k\| \geq \tau_1$ , а число  $\tau_1 > 0$  задає формула

$$\begin{aligned} \tau_1 = \gamma_0^{-1} \max \left( 1, 6 \frac{|\beta_2| T_1^{r_2}}{|\alpha_2| r_2!} + 4 \frac{|\beta_1| T_1^{r_1}}{|\alpha_1| r_1!} + \right. \\ \left. + \frac{4 |\beta_1\beta_2| T_1^{r_1+r_2+1}}{r_1 |\alpha_1\alpha_2| r_1! r_2!} \right), \end{aligned}$$

міра множини

$$\{T \in [T_0, T_1] : |\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)| < \varepsilon_{lk}\}$$

не перевищує числа  $\frac{c}{|\alpha_1\alpha_2|} \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{\gamma_0} \varepsilon_{lk}$ .

**Доведення.** Нехай  $h(T, \gamma) = \Gamma_\gamma^+ \Delta(\gamma)$ , тоді

$$\begin{aligned} h(T, \gamma) &= 2i\alpha_1\alpha_2\gamma e^{i\gamma T} + \alpha_1\beta_2\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{0,-}(r_2) - \\ &- \alpha_2\beta_1\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{T,-}(r_1) + \beta_1\beta_2\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(\vec{r}), \end{aligned}$$

де  $\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{0,-}(r) = i\gamma \mathcal{I}^{0,-}(r) - \frac{T^r}{r!} \mathcal{I}^{T,-}(-1)$ ,

$$\begin{aligned} \Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{T,-}(r) &= 2 \left( e^{i\gamma T} \mathcal{I}_-(r-1) - \frac{T^r}{r!} \right), \\ \Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(\vec{r}) &= \frac{T^{r_1}}{r_1!} \mathcal{I}^{T,-}(r_2) - \\ &\quad - \frac{T^{r_2}}{r_2!} \mathcal{I}^{T,-}(r_1) + i\gamma \mathcal{I}^-(\vec{r}), \end{aligned}$$

З формул (41)–(43) маємо нерівності

$$\begin{aligned} |\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{0,-}(r)| &\leq 6 \frac{T^r}{r!}, \quad |\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^{T,-}(r)| \leq 4 \frac{T^r}{r!}, \\ |\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(\vec{r})| &\leq \frac{16 T^{r_1+r_2}}{\gamma r_1! r_2!}, \end{aligned}$$

тому для всіх  $k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$  з властивістю  $\|\mu_k\| \geq \tau_1$  на  $[T_0, T_1]$  справджується оцінка

$$\begin{aligned} |h(T, \gamma_l \|\mu_k\|)| &\geq |\alpha_1 \alpha_2| \left( 2\gamma_l \|\mu_k\| - 6 \frac{|\beta_2| T^{r_2}}{|\alpha_2| r_2!} - \right. \\ &\quad \left. - 4 \frac{|\beta_1| T^{r_1}}{|\alpha_1| r_1!} - \frac{16 |\beta_1 \beta_2| T^{r_1+r_2+1}}{\gamma_l d_1 |\alpha_1 \alpha_2| r_1! r_2!} \right) \geq \\ &\geq |\alpha_1 \alpha_2| (2\gamma_l \|\mu_k\| - \gamma_0 \tau_1) \geq |\alpha_1 \alpha_2| \gamma_l \|\mu_k\| > 0. \end{aligned}$$

Тоді за лемою 1 для кожного

$$\varepsilon_{lk} \in \left( 0, \frac{|\alpha_1 \alpha_2| \gamma_0}{4(\gamma_0 + \gamma_1)} \right) \subset \left( 0, \frac{|\alpha_1 \alpha_2| \gamma_l \|\mu_k\|}{4(1 + \gamma_1 \|\mu_k\|)} \right)$$

нерівність  $|\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)| < \varepsilon_{lk}$  виконується на підмножині відрізка  $[T_0, T_1]$ , міра якої не перевищує

$$\frac{c(1 + \gamma_1 \|\mu_k\|)}{|\alpha_1 \alpha_2| \gamma_l \|\mu_k\|} \varepsilon_{lk} \leq \frac{c}{|\alpha_1 \alpha_2|} \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{\gamma_0} \varepsilon_{lk}.$$

Лему доведено.

**Теорема 2.** Нехай  $\alpha_1 \alpha_2 \neq 0$ , виконуються умови  $\{\varphi_1, \varphi_2\} \in \mathbf{H}_M^{q_*+q}$  і  $q_* > p/\theta_1$ , тоді для майже всіх чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , тобто для  $T \in \mathcal{T}_0$ , де  $\text{meas } \mathcal{T}_0 = T_1 - T_0$ , існує єдиний розв'язок  $u$  задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ ; цей розв'язок є сумою

$$u = \Pi_{\tau_1} u + (I - \Pi_{\tau_1}) u,$$

де  $\Pi_{\tau_1} u$  — майже періодичний многочлен, причому  $\tau_1$  — число з лемми 2, і для довільного  $\varepsilon \in (0, c\zeta(q_*)/2)$  існує множина  $\mathcal{T}_\varepsilon \subset \mathcal{T}_0$

з мірою  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$ , причому для всіх  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  маємо нерівність

$$\begin{aligned} \|(I - \Pi_{\tau_1}) u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq (1 + \gamma_1^2 + \gamma_1^4) \left( \frac{2c\zeta(q_*)}{\varepsilon |\alpha_1 \alpha_2|} \right)^2 \times \\ &\times \left( 1 + \frac{\gamma_1}{\gamma_0} \right)^2 \sum_{j=1}^2 c_{1j}^2 \|(I - \Pi_{\tau_1}) \varphi_j; \mathbf{H}_M^{q_*+q}\|^2. \quad (49) \end{aligned}$$

**Доведення.** З лемми 2 випливає, що міра множини чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких при фіксованих  $l \in \{0, 1\}$  і  $k \in \mathbb{Z}^p$ , де  $\|\mu_k\| \geq \tau_1$ , не виконується нерівність

$$\begin{aligned} |\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|)| &\geq \\ &\geq \frac{\varepsilon |\alpha_1 \alpha_2| \gamma_0}{2c\zeta(q_*)(\gamma_0 + \gamma_1)} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} \quad (50) \end{aligned}$$

не перевищує числа  $\varepsilon(1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2}/2\zeta(q_*)$ . Оскільки

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} = \zeta(q_*) < \infty,$$

то за лемою Бореля–Кантеллі для майже всіх  $T \in [T_0, T_1]$  оцінка (50) справджується для всіх векторів  $k$  з великою нормою  $\|k\|$ . Вилучимо з відрізка  $[T_0, T_1]$  множину міри нуль чисел  $T$ , для яких  $\Delta(\gamma_l \|\mu_k\|) = 0$  хоча б для одної пари  $(l, k)$  і позначимо отриману множину  $\mathcal{T}_0$ . Очевидно,  $\text{meas } \mathcal{T}_0 = T_1 - T_0$ , а для кожної точки  $T \in \mathcal{T}_0$  справджується необхідна та достатня умова розв'язності (44) з  $q_0 = -q_*$  і сталими

$$0 < C_{0l} \leq \frac{\varepsilon |\alpha_1 \alpha_2| \gamma_0}{2c\zeta(q_*)(\gamma_0 + \gamma_1)}, \quad l = 0, 1;$$

тому перше твердження теореми випливає з доведення теореми 1.

Позначимо  $\mathcal{T}_\varepsilon$  множину  $\mathcal{T}_0$ , з якої вилучено об'єднання міри не більше  $\varepsilon$  множин таких чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких не справджується (50) для фіксованих пар

$$(l, k) \in \{0, 1\} \times \{k \in \mathbb{Z}^p : \|\mu_k\| \geq \tau_1\},$$

тоді маємо нерівність  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$  і для  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  справджується оцінка (49).

**Наслідок 1.** Якщо швидкість зміни частот  $\theta_1$  у спектрі  $M$  майже періодичних

функцій прямує до  $+\infty$ , то  $q_* \rightarrow 0$  і умова розв'язності  $\{\varphi_1, \varphi_2\} \in \mathbf{H}_M^{q_*+q}$  теореми 2 послаблюється до необхідної умови (4) розв'язності задачі (1), (2).

Перейдемо до вивчення випадку 2°) і використаємо оцінку

$$\begin{aligned} \|u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \sum_{j,l=1}^2 \sum_{\alpha=0}^2 \frac{(1 + \|\mu_k\|^2)^{q-\alpha}}{|\mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|)|^2} \times \\ &\times \max_{0 \leq t \leq T} \left| \frac{d^\alpha \mathcal{I}^{t,-}(r_{\omega(j)}, \gamma_l \|\mu_k\|)}{dt^\alpha} \right|^2 \|\Pi_k^l \varphi_{jk}\|^2 \leq \\ &\leq 16 \sum_{k \in \mathbb{Z}^p} \sum_{j,l=1}^2 \left( \frac{T^{\omega(j)}}{r_{\omega(j)}!} \right)^2 \sum_{\alpha=0}^2 \frac{(1 + \|\mu_k\|^2)^{q-\alpha}}{|\mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|)|^2} \times \\ &\quad \times (\gamma_l \|\mu_k\|)^{2\alpha-2} \|\Pi_k^l \varphi_{jk}\|^2, \quad (51) \end{aligned}$$

яка випливає з формули (35).

**Теорема 3.** Нехай  $\vec{\alpha} = 0$ , а функції  $\{\varphi_1, \varphi_2\} \in \mathbf{H}_M^{q+2}$ . Якщо виконуються умови  $r_1 \neq r_2$  і  $\min(r_1, r_2) \geq 2$ , то існує множина  $\mathcal{T}'_0$  з мірою  $\text{meas } \mathcal{T}'_0 = T_1 - T_0$  така, що для всіх  $T \in \mathcal{T}'_0$  існує єдиний розв'язок

$$u = u_{\vec{0}, \vec{\beta}} = \Pi_{\tau'_2} u + (I - \Pi_{\tau'_2}) u,$$

задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ , де  $\Pi_{\tau'_2} u$  — майже періодичний многочлен,

$$\begin{aligned} \|(I - \Pi_{\tau'_2}) u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \\ &\leq \sum_{j=1}^2 \frac{C_{2j}'^2}{|\beta_j|^2} \|(I - \Pi_{\tau'_2}) \varphi_j; \mathbf{H}_M^{q+2}\|^2, \quad (52) \end{aligned}$$

$$a \tau'_2 = \frac{4}{\gamma_0 T_0} \frac{r_1 r_2}{|r_1 - r_2|} (r_1 + r_2 - 1) i$$

$$C_{2j}' = \frac{4\gamma_1^2 \sqrt{1 + \gamma_1^2 + \gamma_1^4}}{|r_1 - r_2|} \frac{r_j!}{T_0^{r_j-1}};$$

якщо ж  $\vec{r} = (r_1, r_2) \in \{(1, r), (r, 1)\}$ , причому  $r \geq 3$ , то існує множина  $\mathcal{T}''_0$  така, що міра  $\text{meas } \mathcal{T}''_0 = T_1 - T_0$  і для всіх  $T \in \mathcal{T}''_0$  існує єдиний розв'язок

$$u = u_{\vec{0}, \vec{\beta}} = \Pi_{\tau''_2} u + (I - \Pi_{\tau''_2}) u,$$

задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ , де  $\Pi_{\tau''_2} u$  —

майже періодичний многочлен,

$$\begin{aligned} \|(I - \Pi_{\tau''_2}) u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \\ &\leq C_2''^2 \sum_{j=1}^2 \frac{1}{|\beta_j|^2} \|(I - \Pi_{\tau''_2}) \varphi_j; \mathbf{H}_M^{q+2}\|^2, \quad (53) \end{aligned}$$

$$a \tau''_2 = \frac{4r}{\gamma_0 T_0} \frac{r+1}{r-2} i$$

$$C_2'' = \frac{4\gamma_1^2 \sqrt{1 + \gamma_1^2 + \gamma_1^4}}{r-2} \max\left(1, \frac{r!}{T_0^{r-1}}\right).$$

**Доведення.** Комбінуючи рекурентні формули (37), (38) для  $\sigma_0 = 1$ , маємо

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(\gamma)}{\beta_1 \beta_2} = \mathcal{I}^-(\vec{r}) &= \frac{1}{\gamma^2} \left( \mathcal{I}^-(r_1 - 1, r_2 - 1) - \right. \\ &- \frac{T^{r_1}}{r_1!} \mathcal{I}^{T,-}(r_2 - 1) + \frac{T^{r_2}}{r_2!} \mathcal{I}^{T,-}(r_1 - 1) \Big) = \\ &= \frac{i}{\gamma^3} \left( 2 \frac{r_1 - r_2}{T} \frac{T^{r_1+r_2-1}}{r_1! r_2!} - i \gamma \mathcal{I}^-(r_1 - 1, r_2 - 1) + \right. \\ &+ \frac{T^{r_1}}{r_1!} \mathcal{I}^{T,+}(r_2 - 2) - \frac{T^{r_2}}{r_2!} \mathcal{I}^{T,+}(r_1 - 2) \Big). \quad (54) \end{aligned}$$

Звідси за умови  $\gamma \geq \frac{4}{T} \frac{r_1 r_2}{|r_1 - r_2|} (r_1 + r_2 - 1)$  отримуємо оцінку знизу

$$|\mathcal{I}^-(\vec{r})| \geq \frac{|r_1 - r_2|}{\gamma^3 T} \frac{T^{r_1+r_2}}{r_1! r_2!},$$

зокрема при  $\|\mu_k\| \geq \tau'_2$  маємо

$$|\mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|)| \geq \frac{|r_1 - r_2|}{\gamma_l^3 \|\mu_k\|^3} \frac{T^{r_1+r_2-1}}{r_1! r_2!}. \quad (55)$$

Вилучимо з відрізка  $[T_0, T_1]$  точки  $T$ , які є коренями рівнянь  $\mathcal{I}^-(\vec{r}, \gamma_l \|\mu_k\|) = 0$  у разі  $\|\mu_k\| < \tau'_2$  та  $l \in \{0, 1\}$ , і позначимо отриману множину  $\mathcal{T}'_0$ . Очевидно, що  $\text{meas } \mathcal{T}'_0 = T_1 - T_0$  і виконується умова однозначної розв'язності (44) для  $q_0 = -3$  і

$$0 < C_{0l} \leq |\beta_1 \beta_2| \frac{|r_1 - r_2|}{\gamma_l^3 T_0} \frac{T_0^{r_1+r_2}}{r_1! r_2!}.$$

Із оцінок (41), (55) і формул (32), (51) отримуємо нерівність (52).

В іншому випадку за формулою (54) і оцінками (41), (43) за умови  $\gamma \geq \frac{4r}{T} \frac{r-1}{r+2}$

записуємо

$$|\mathcal{I}^-(1, r)| = |\mathcal{I}^-(r, 1)| \geq \frac{r-2}{\gamma^3} \frac{T^r}{r!},$$

зокрема при  $\|\mu_k\| \geq \tau_2''$  маємо

$$|\mathcal{I}^-(1, r, \gamma_l \|\mu_k\|)| = |\mathcal{I}^-(r, 1, \gamma_l \|\mu_k\|)| \geq \frac{r-2}{\gamma_l^3 \|\mu_k\|^3} \frac{T^r}{r!}. \quad (56)$$

Вилучимо з відрізка  $[T_0, T_1]$  точки  $T$ , які є коренями рівнянь

$$\mathcal{I}^-(1, r, \gamma_l \|\mu_k\|) \mathcal{I}^-(r, 1, \gamma_l \|\mu_k\|) = 0$$

у разі  $\|\mu_k\| < \tau_2''$  та  $l \in \{0, 1\}$ , і позначимо отриману множину  $\mathcal{T}_0''$ . Очевидно, що  $\text{meas } \mathcal{T}_0'' = T_1 - T_0$  і виконується умова однозначної розв'язності (44) для  $q_0 = -3$  і

$$0 < C_{0l} \leq |\beta_1 \beta_2| \frac{r-2}{\gamma_l^3} \frac{T_0^r}{r!}.$$

Із оцінок (41), (56) і формул (32), (51) отримуємо нерівність (53).

Теорема 3 показує відсутність малих знаменників за умови вимірювання лише моментів шуканої функції, якщо порядок моментів великий.

Наступна теорема стосується моменту нульового порядку; у цьому разі знову проявляється проблема малих знаменників.

**Теорема 4.** Нехай  $\vec{\alpha} = 0$  і  $\vec{r} = (r_1, r_2) \in \{(0, r), (r, 0)\}$ , де  $r \geq 1$ . Якщо виконуються умови  $\{\varphi_1, \varphi_2\} \in \mathbf{H}_M^{1+q_*+q}$  і  $q_* > p/\theta_1$ , тоді для майже всіх чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , тобто для  $T \in \mathcal{T}_0$ , де  $\text{meas } \mathcal{T}_0 = T_1 - T_0$ , існує єдиний розв'язок у задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ ; цей розв'язок є сумою

$$u = \Pi_{\tau_3} u + (I - \Pi_{\tau_3}) u,$$

де  $\Pi_{\tau_3} u$  — майже періодичний многочлен з  $\tau_3 = \max\left(1, \frac{1}{\gamma_0}, \frac{12r}{\gamma_0 T_0}\right)$ , і для всякого числа

$\varepsilon \in \left(0, \frac{c}{2} \zeta(q_*) \frac{r!}{T_0^r}\right)$ , існує множина  $\mathcal{T}_\varepsilon \subset \mathcal{T}_0$  з мірою  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$ , що для всіх  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  маємо нерівність

$$\begin{aligned} \|(I - \Pi_{\tau_3}) u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \\ &\leq C_3^2 \sum_{j=1}^2 \frac{1}{|\beta_j|^2} \|(I - \Pi_{\tau_3}) \varphi_j; \mathbf{H}_M^{1+q_*+q}\|^2, \end{aligned} \quad (57)$$

де

$$C_3 = \frac{16c}{\varepsilon} \zeta(q_*) (\gamma_0 + \gamma_1) \times \\ \times \sqrt{1 + \gamma_1^2 + \gamma_1^4} \max\left(\frac{T_1^r}{T_0^r}, \frac{r!}{T_0^r}\right).$$

**Доведення.** З формули (54) випливає, що

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(\gamma)}{\beta_1 \beta_2} = \mathcal{I}^-(0, r) &= \frac{1}{\gamma^2} \left( \mathcal{I}^{0,-}(r-1) - \right. \\ &\left. - \mathcal{I}^{T,-}(r-1) + 2i \frac{T^r}{r!} \sin \gamma T \right). \end{aligned}$$

Для використання леми 1 запишемо

$$\begin{aligned} \Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(0, r) &= \gamma^{-2} \Gamma_\gamma^+ \left( \mathcal{I}^{0,-}(r-1) - \right. \\ &\left. - \mathcal{I}^{T,-}(r-1) \right) + \frac{2i}{\gamma^2} \frac{T^{r-1}}{(r-1)!} \sin \gamma T + \frac{2i}{\gamma} \frac{T^r}{r!} e^{i\gamma T} \end{aligned}$$

і оцінку для  $\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(0, r)$  за умови  $\gamma \geq 12r/T_0$ :

$$|\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(0, r)| \geq \frac{2}{\gamma} \frac{T^r}{r!} \left(1 - \frac{6r}{\gamma T}\right) \geq \frac{1}{\gamma} \frac{T_0^r}{r!},$$

зокрема для  $\|\mu_k\| \geq \tau_3$  маємо

$$|\Gamma_\gamma^+ \mathcal{I}^-(0, r, \gamma_l \|\mu_k\|)| \geq \frac{1}{\gamma_l \|\mu_k\|} \frac{T_0^r}{r!}, \quad l = 0, 1.$$

Міра множини чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких при фіксованих  $l \in \{0, 1\}$  і  $k \in \mathbb{Z}^p$ , де  $\|\mu_k\| \geq \tau_3$ , не виконується нерівність

$$\begin{aligned} |\mathcal{I}^-(0, r, \gamma_l \|\mu_k\|)| &\geq \frac{\varepsilon}{2c(\gamma_0 + \gamma_1) \gamma_l} \times \\ &\times \frac{1}{\zeta(q_*)} \frac{T_0^r}{r!} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-1-q_*/2} \end{aligned} \quad (58)$$

не перевищує числа  $\varepsilon(1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} / 2\zeta(q_*)$ . Оскільки  $\sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} = \zeta(q_*) < \infty$ , то за лемою Бореля–Кантеллі для майже всіх  $T \in [T_0, T_1]$  оцінка (58) справджується для всіх векторів  $k$  з великою нормою  $\|k\|$ .

Вилучимо з відрізка  $[T_0, T_1]$  множину міри нуль чисел  $T$ , для яких

$$\mathcal{I}^-(0, r, \gamma_l \|\mu_k\|) = 0$$

хоча б для одної пари  $(l, k)$ , і позначимо отриману множину  $\mathcal{T}_0$ . Очевидно,  $\text{meas } \mathcal{T}_0 =$

$T_1 - T_0$ , а для кожної точки  $T \in \mathcal{T}_0$  справджується необхідна і достатня умова розв'язності (44) з  $q_0 = -q_*$  і сталими

$$0 < C_{ol} \leq \frac{\varepsilon|\beta_1\beta_2|}{2c(\gamma_0 + \gamma_1)\gamma_l\zeta(q_*)} \frac{T_0^r}{r!};$$

тому перше твердження теореми впливає з доведення теореми 1.

Позначимо  $\mathcal{T}_\varepsilon$  множину  $\mathcal{T}_0$ , з якої вилучено об'єднання міри  $\varepsilon$  множин таких чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких не справджується (58) для фіксованих пар

$$(l, k) \in \{0, 1\} \times \{k \in \mathbb{Z}^p: \|\mu_k\| \geq \tau_3\},$$

тоді маємо нерівність  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$  і для  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  справджується оцінка (57).

Останній нерозглянутий випадок, а саме  $\vec{r} \in \{(1, 2), (2, 1)\}$ , зводиться до оцінювання однакових за модулем функцій  $\mathcal{I}^-(1, 2)$  та  $\mathcal{I}^-(2, 1)$  із урахуванням формули

$$|\mathcal{I}^-(1, 2)| = -\frac{2i}{\gamma^3} S^2(T, \gamma), \quad \gamma > 0, T > 0, \quad (59)$$

$$\text{де } S(T, \gamma) = T \cos \frac{\gamma T}{2} - \frac{2}{\gamma} \sin \frac{\gamma T}{2}.$$

**Лема 3.** Для довільного  $\varepsilon_{lk} \in (0, \frac{T_0}{16})$ , де  $l \in \{0, 1\}$ , вектор  $k \in \mathbb{Z}^p$  задовольняє умову  $\|\mu_k\| \geq \tau_4$ , а число  $\tau_4 > 0$  задає формула

$$\tau_4 = \frac{2}{\gamma_0} \max \left( 1, \frac{2}{T_0} \right),$$

міра множини

$$\{T \in [T_0, T_1]: |S(T, \gamma_l \|\mu_k\|)| < \varepsilon_{lk}\}$$

не перевищує числа  $\frac{2c}{T_0} \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{\gamma_0} \varepsilon_{lk}$ .

**Доведення.** Нехай  $H(T, \gamma) = \Gamma_{\gamma/2}^+ S(T, \gamma)$ , тоді

$$h(T, \gamma) = \left( \frac{d}{dT} + i \frac{\gamma}{2} \right) S(T, \gamma) = i \frac{\gamma T}{2} e^{i\gamma T/2} - i \sin \frac{\gamma T}{2},$$

тому для всіх  $k \in \mathbb{Z}^p \setminus \{0\}$  з властивістю  $\|\mu_k\| \geq \tau_4$  на  $[T_0, T_1]$  справджується оцінка

$$|H(T, \gamma_l \|\mu_k\|)| \geq \frac{\gamma T_0}{2} - 1 \geq \frac{\gamma T_0}{4} > 0.$$

Тоді за лемою 1 для кожного

$$\varepsilon_{lk} \in \left( 0, \frac{T_0}{16} \right) \subset \left( 0, \frac{\gamma_l \|\mu_k\| T_0}{16(1 + \gamma_l \|\mu_k\|/2)} \right)$$

нерівність  $|S(T, \gamma_l \|\mu_k\|)| < \varepsilon_{lk}$  виконується на підмножині відрізка  $[T_0, T_1]$ , міра якої не перевищує

$$\frac{4c(1 + \gamma_l \|\mu_k\|/2)}{\gamma_l \|\mu_k\| T_0} \varepsilon_{lk} \leq \frac{2c}{T_0} \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{\gamma_0} \varepsilon_{lk}.$$

Лему доведено.

**Теорема 5.** Нехай вектор  $\vec{a} = 0$ , а вектор  $\vec{r} \in \{(1, 2), (2, 1)\}$ , виконуються умови  $\{\varphi_1, \varphi_2\} \in \mathbf{H}_M^{2+2q_*+q}$  і  $q_* > p/\theta_1$ , тоді для майже всіх чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , тобто для  $T \in \mathcal{T}_0$ , де  $\text{meas } \mathcal{T}_0 = T_1 - T_0$ , існує єдиний розв'язок и задачі (1), (2) у просторі  $\mathbf{H}_M^{2,q}$ ; цей розв'язок є сумою

$$u = \Pi_{\tau_4} u + (I - \Pi_{\tau_4}) u,$$

де  $\Pi_{\tau_4} u$  – майже періодичний многочлен, причому  $\tau_4$  – число з леми 3, і для довільного  $\varepsilon \in (0, \frac{c\zeta(q_*)}{4} (1 + \frac{\gamma_1}{\gamma_0}))$  існує множина  $\mathcal{T}_\varepsilon \subset \mathcal{T}_0$  з мірою  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$ , причому для всіх  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  маємо нерівність

$$\begin{aligned} \|(I - \Pi_{\tau_4}) u; \mathbf{H}_M^{2,q}\|^2 &\leq \\ &\leq C_4^2 \sum_{j=1}^2 \|(I - \Pi_{\tau_4}) \varphi_j; \mathbf{H}_M^{2+2q_*+q}\|^2, \quad (60) \end{aligned}$$

де  $C_4 = \sqrt{1 + \gamma_1^2 + \gamma_1^4} \max \left( \frac{T_1^2}{2}, T_1 \right) \left( \frac{c\zeta(q_*)\gamma_1}{\varepsilon T_0} \right)^2$ .

**Доведення.** З леми 3 впливає, що міра множини чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких при фіксованих  $l \in \{0, 1\}$  і  $k \in \mathbb{Z}^p$ , де  $\|\mu_k\| \geq \tau_1$ , не виконується нерівність

$$\begin{aligned} |S(T, \gamma_l \|\mu_k\|)| &\geq \\ &\geq \frac{\varepsilon T_0 \gamma_0}{4c\zeta(q_*)(\gamma_0 + \gamma_1)} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} \quad (61) \end{aligned}$$

не перевищує числа  $\varepsilon(1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2}/2\zeta(q_*)$ . Оскільки

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^p} (1 + \|\mu_k\|^2)^{-q_*/2} = \zeta(q_*) < \infty,$$

то за лемою Бореля–Кантеллі для майже всіх  $T \in [T_0, T_1]$  оцінка (61) справджується для всіх векторів  $k$  з великою нормою  $\|k\|$ . Вилучимо з відрізка  $[T_0, T_1]$  множину міри нуль чисел  $T$ , для яких  $S(T, \gamma_l \|\mu_k\|) = 0$  хоча б для одної пари  $(l, k)$  і позначимо отриману множину  $\mathcal{T}_0$ . Очевидно,  $\text{meas } \mathcal{T}_0 = T_1 - T_0$ , а для кожної точки  $T \in \mathcal{T}_0$  справджується необхідна і достатня умова розв'язності (44) з  $q_0 = -2 - 2q_*$  і сталими

$$0 < C_{0l} \leq \frac{\varepsilon^2 \gamma_0^2}{8c^2 \zeta^2(q_*) \gamma_l^3 (\gamma_0 + \gamma_1)^2}, \quad l = 0, 1;$$

тому перше твердження теореми впливає з доведення теореми 1.

Позначимо  $\mathcal{T}_\varepsilon$  множину  $\mathcal{T}_0$ , з якої вилучено об'єднання міри не більше  $\varepsilon$  множин таких чисел  $T \in [T_0, T_1]$ , для яких не справджується (61) для фіксованих пар

$$(l, k) \in \{0, 1\} \times \{k \in \mathbb{Z}^p : \|\mu_k\| \geq \tau_4\},$$

тоді маємо нерівність  $\text{meas } \mathcal{T}_\varepsilon \geq T_1 - T_0 - \varepsilon$  і для  $T \in \mathcal{T}_\varepsilon$  справджується оцінка (60).

Теореми 3–5 дають класифікацію розв'язності задачі (1), (2) у випадку 2°) — чисто інтегральних вимірювань моментів шуканого розв'язку.

Зокрема, теорема 3 встановлює, що для довільного  $T \in [T_0, T_1]$  задача (1), (2) може мати лише скінченновимірне ядро, розмірність якого залежить від спектра  $M$  і регулюється лише числами  $\tau_2'$  чи  $\tau_2''$ , а для майже всіх  $T$  ядро задачі — тривіальне. Малих знаменників немає, гладкість правих частин зростає на дві одиниці у порівнянні з гладкістю у необхідній умові розв'язності (4).

Координати відповідних вузлів нижче поданої таблиці з осями  $r_1$  та  $r_2$  помічені цифрою 2 і означають компоненти вектора  $\vec{r} = (r_1, r_2)$  порядків моментів в умовах (2).

У теоремі 4 і у теоремі 5 встановлено тривіальність ядра задачі для майже всіх  $T \in [T_0, T_1]$  і збільшення гладкості правих частин на  $1+q_*$  ( $> 1+p/\theta_1$ ) та  $2+2q_* = 2(1+q_*)$  одиниць відповідно. Задача має малі знаменники, розв'язок, взагалі, не існує у шкалах розглядуваних просторів, для множини чисел  $T$  нульової міри може бути як скінченновимірне, так і нескінченновимірне ядро. Числа

$1+q_*$  і  $2+2q_*$  помічають відповідні точки у таблиці. Діагональні точки позначені у таблиці знаком \* означають нескінченновимірне ядро в задачі для всіх  $T \in [T_0, T_1]$ .

5	$1+q_*$	2	2	2	2	*
4	$1+q_*$	2	2	2	*	2
3	$1+q_*$	2	2	*	2	2
2	$1+q_*$	$2+2q_*$	*	2	2	2
1	$1+q_*$	*	$2+2q_*$	2	2	2
0	*	$1+q_*$	$1+q_*$	$1+q_*$	$1+q_*$	$1+q_*$
$r_2/r_1$	0	1	2	3	4	5

**Висновки.** Встановлено умови однозначної розв'язності задачі з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме — задачі (1), (2) — у просторах майже періодичних функцій. Ця задача є некоректною за Адамаром і породжує проблему малих знаменників, характерних для інтегро-крайових умов (2). Для розв'язання проблеми малих знаменників використовуємо метричний підхід і методу оцінювання мір виняткових множин.

Визначено вплив параметрів  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  і показників  $\theta_1, \theta_2$  на розв'язність задачі, зокрема ефективність використання комбінації крайових та інтегральних умов і відповідних просторів майже періодичних функцій. Показано, що у разі чисто інтегральних умов, малі знаменники присутні лише для моментів нульового і першого порядків.

Отримано підсилення і доповнення результатів роботи [14] (про коректну розв'язність задачі (1), (2) у частинному випадку  $p = 3$  для дійсних  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  і  $r_1 < r_2$ ).

Зокрема, для порівняння наведемо відповідні формули з роботи [14] для елементів  $S(r_1, r_2)$  подібної до наведеної вище таблиці:

$$S(r_1, r_2) = \begin{cases} 51r_* + 22 + (153r_* + 51)/\theta_1, \\ 54r_* + 28 + (153r_* + 55)/\theta_1, \end{cases}$$

для випадків  $\alpha_1 \alpha_2 \neq 0$  та  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$  відповідно, де  $r_* = r_1 + r_2$ .

У роботі зменшено наведені значення  $S(r_1, r_2)$  до таких ( $p = 3, r_1 \neq r_2$ ):

$$S(r_1, r_2) = 2 + 3/\theta_1, \quad \text{якщо } \alpha_1 \alpha_2 \neq 0, \text{ і}$$

$$S(r_1, r_2) = \begin{cases} 3 + 3/\theta_1, & r_1 = 0, \text{ або } r_2 = 0, \\ 4 + 6/\theta_1, & r_1 = 1, r_2 = 2, \\ 4 + 6/\theta_1, & r_1 = 2, r_2 = 1, \\ 4, & \text{в інших випадках,} \end{cases}$$

якщо  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ .

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Fardigola L. V. *Test for propriety in a layer of a boundary problem with integral condition* // Ukr. Math. J. – 1990. – 42, No. 11. – P. 1388–1394.
- Fardigola L. V. *An integral boundary-value problem in a layer for a system of linear partial differential equations* // Sbornik Math. – 1995. – 53, No. 6. – P. 1671–1692.
- Ільків В. С. *Задача з інтегральними умовами для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними і змінними коефіцієнтами* // Вісн. держ. ун-ту „Львів. політехніка“. Сер. Прикл. математика. – 1999. – №364. – С. 318–323.
- Pul'kina L. S. *A nonlocal problem with integral conditions for a hyperbolic equation* // Diff. Eq. – 2004. – 40, No. 7. – P. 947–953.
- Медвідь О. М., Симолюк М. М. *Задача з інтегральними умовами для лінійних систем рівнянь із частинними похідними* // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 1. – С. 32–39.
- Ільків В. С., Магеровська Т. В. *Задача з інтегральними умовами для рівняння з частинними похідними другого порядку* // Вісн. Нац. у-ту „Львів. політехніка“. – 2008. – №625. – С. 12–19.
- Avalishvili G., Avalishvili M., Gordeziani D. *On integral nonlocal boundary value problems for some partial differential equations* // Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. – 2011. – 5, No. 11. – P. 31–37.
- Kuz' A. M., Ptashnyk V. I. *A problem with integral conditions with respect to time for Gårding hyperbolic equations* // Ukr. Math. J. – 2013. – 65, No. 2. – P. 277–293.
- Каленюк П. І., Ільків В. С., Нитребич З. М., Когут І. В. *Однозначна розв'язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом* // Вісн. Нац. у-ту „Львів. політехніка“. – 2013. – Вип. 768. – С. 5–11.
- Симолюк М. М., Савка І. Я. *Початково-нелокальна задача для факторизованого рівняння із частинними похідними* // Вісн. Нац. у-ту „Львів. політехніка“. – 2013. – Вип. 768. – С. 19–25.
- Пташник Б. Й., Ільків В. С., Кміть І. Я., Поліщук В. М. *Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними*. – К.: Наук. думка, 2002. – 416 с.
- Ільків В. С., Пташник Б. Й. *Задача з нелокальними умовами для рівнянь з частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників* // Укр. мат. журн. – 2006. – 58, №12 – С. 1624–1650.
- Седбов Л. И. *Механика сплошной среды*. – М.: Наука, 1970. – Т. 1. – 492 с.
- Кузь А. М., Пташник Б. Й. *Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь динамічної теорії пружності* // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 4. – С. 40–53.
- Нитребич З. М. *Операційний метод побудови розв'язку задачі Коші для неоднорідних рівнянь Ламе* // Доп. НАН України. – 1995. – №7. – С. 32–34.
- Каленюк П. І., Нитребич З. М., Сохан П. Л. *Операційний метод побудови розв'язку задачі Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь із частинними похідними безмежного порядку*. – Львів, 1995. – 42 с. – (Препр. / НАН України. Ін-т прикл. проблем механіки і математики; № 1–95).
- Бобик І. О., Симолюк М. М. *Задача з двома кратними вузлами для лінійних факторизованих рівнянь із частинними похідними* // Вісн. Нац. у-ту „Львів. політехніка“. – 2010. – Вип. 687. – С. 11–19.